

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう保管してください。

角質剥離剤

指定医薬部外品

販売名：スピール膏CX

スピール膏<sup>TM</sup> うおのめ・たこピンポイント除去タイプ

品番：SPCXN

スピール膏<sup>TM</sup> うおのめ・たこピンポイント除去タイプは、サリチル酸の角質軟化溶解作用を利用したバンデージタイプの角質剥離剤です。厚く硬くなった皮ふをやわらかくし、うおのめ、たこを取り去ります。又、保護用パッドにより患部を守り、外部からの刺激による痛みをやわらげます。

### ⚠ 使用上の注意

#### ❌【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください。

乳幼児

2. 次の部位には使用しないでください。

① 目の周囲、粘膜、やわらかい皮ふ面(首の周り等)、顔面等  
(角質溶解作用の強い薬剤ですからこのような部位には使用しないこと)

② 炎症又はキズ、化膿のある患部等  
(炎症やキズ、化膿のある患部等に使用すると刺激が強く、症状を悪化させることがあります)

③ いぼ



#### 【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

① 本人又は家族がアレルギー体質の人

② 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起したことがある人  
(アレルギーを起こした薬や成分を避けて使用する必要があります)

③ 妊婦又は妊娠していると思われる人  
(サリチル酸の内服による動物実験で、胎児の奇形を起こす作用が報告されています)

④ 糖尿病の治療を受けている人  
(糖尿病患者は感染抵抗力が低下しています。角質を取るときに皮ふを傷つけてしまった場合、感染しやすくなります)

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

3. 長期間使用しても症状の改善がみられない場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

#### 【その他の注意】

本品や固定用テープ等をはがす時は、皮ふを傷めないように体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。

### 効能・効果

うおのめ、たこ

### 用法・用量

本品を台紙からはがし、薬剤部分を患部にズレないように貼り、2～3日毎に新しい薬剤付パッドと交換してください。

#### 【用法・用量に関連する注意】

- ① 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- ② 本品は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- ③ 緑色の薬剤部分が健康な皮ふに付着すると、その部分も白く軟化し、痛んだりしますので、患部の周りの皮ふにつかないようによく注意して使用してください。  
★裏面の〈上手な使用例〉をご覧ください。
- ④ 固定用テープをお使いの際には、皮ふかぶれやテープのはがれをさけるため、テープを伸ばさずにお貼りください。

### 成分・分量

成分(1cm<sup>2</sup>中): サリチル酸…45mg(サリチル酸50%配合)  
添加物として、生ゴム、中鎖脂肪酸トリグリセリド、水素添加ロジングリセリンエステル、精製ラノリン、銅クロロフィリンナトリウム、その他1成分を含有する。

### 保管及び取り扱い上の注意

- ① 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- ② 小児の手のとどかない所に保管してください。
- ③ 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- ④ 開封後、残った薬剤付パッド(本品)及び固定用テープ類は、品質保持のため、それぞれもとの袋に戻しもとの箱に入れて保管してください。

### 包 装

- 本品(薬剤部分直径10mm) ……………8枚
- サイズ調整シール(穴の直径5mm、7mm、9mm) ……各9枚
- 固定用テープ(12mm×60mm) ……………8枚  
(30mm×40mm) ……………8枚

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口2-3-3


●お問い合わせ先 お客様相談室 TEL:0120-377218  
受付時間:9:00～12:00、13:00～17:00(土・日・祝日を除く)

## 形状

### 薬剤付パッド(本品)


薬剤部分:サリチル酸が患部に浸透し効き目をあらわします。

保護用パッド:粘着剤つきでズレにくく、患部を守り圧迫痛をやわらげます。



### 固定用テープ

のびのびフィット素材で、しっかり固定します。



### サイズ調整シール


患部の周りの健康な皮ふに薬剤が付着するのを防ぎます。

内側の穴の直径


5mm

7mm

9mm



サイズ調整シールの端で台紙を折り曲げ、そこから指でめくると容易にはがせます。



## スピール膏<sup>TM</sup>うおめ・たこピンポイント除去タイプの上手な使用例

※患部をお湯に浸して柔らかくし、よく拭いてからご使用になると一層効果があります。

- ①角質が厚く硬くなっている患部の大きさを確認してください。
- ②緑色の薬剤部分(直径10mm)が患部より大きい場合には、薬剤部分が健康な皮ふに付着して、その部分も白く軟化し痛んだりしますので、それを防ぐ為に、患部の大きさと同じかやや小さい穴のサイズ調整シールを台紙からはがし、患部が穴の範囲に入るように、貼ってください。

患部の直径が10mm以上の場合はサイズ調整シールは不要です。

- ③サイズ調整シールの穴に薬剤部分が当たるように、薬剤付パッドをサイズ調整シールの真上に貼り、絆創膏部分でしっかりとめます。

サイズ調整シールを使わない場合は患部に直接薬剤付パッドを貼ってください。

#### ④〈ゆびの場合〉

添付の固定用テープを、薬剤付パッドと皮ふに半分ずつかかる様に貼ります。次に、薬剤付パッドのもう一方の側にも同様に固定用テープを貼り、しっかり押さえてとめ、2~3日間密着させておきます。毎日交換するより密着性が良くなり、硬くなった患部が早くやわらかくなります。

#### 〈足うらの場合〉

添付の固定用テープでしっかり押さえてとめ、2~3日間密着させておきます。なお、ズレルような場合は、固定用テープを、しっかり貼って押さえておくと効果的です。

毎日交換するより密着性が良くなり、硬くなった患部が早くやわらかくなります。

- ⑤交換の際には、白くなった角質部を消毒したピンセットなどで痛みを感じない程度に取り除きます。


- ⑥患部が完全に取りきれない場合は繰り返し①~⑤を続けます。

- ⑦特にうおめは、しん(角質柱)を完全に取り除かないと何度でも再発しますので、貼り換えの際には白くなった角質部を⑤の要領で取り除いた後、しんがとれるまで根気よく治療を続けましょう。








残っているしんの大きさにあわせてサイズ調整シールをご利用ください。

- ⑧うおめ、たこを取った後、患部が陥没したり、角質が白く硬くなることがありますが、新しい皮ふが再生されますので、清潔にしておいてください。なお、患部が痛むようでしたら、救急絆創膏等を貼っておいてください。

#### 〈ゆびの場合〉



#### 〈足うらの場合〉



※本品を使用したまま入浴してもさしつかえありませんが、患部を密封するなど、ぬれてはがれないように注意してください。ぬれた場合は水分をよくふき取ってください。はがれてしまった場合は交換してください。

※ちょうど良い大きさのサイズ調整シールが無い場合や使い切ってしまった場合は、薬剤部分を患部より少し小さめに切り、ズレないように貼ってください。

#### 貼付例図(うおめ)

