

販売名

ロイヒ膏ロキソプロフェン

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

**7枚**  
7cm×10cm

## 特長

●ロイヒ膏<sup>TM</sup>ロキソプロフェンは、すぐれた鎮痛消炎効果をもつ「ロキソプロフェンナトリウム水和物」を8.1%配合した温感タイプのテープ剤です。●1日1回で痛みの芯まで直接浸透し、つらい患部の痛みに効きます。●無臭タイプなので人前でも臭いが気になりません。

### △ 使用上の注意

#### ☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

#### 1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 15歳未満の小児。

#### 2. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、キズぐち。(3)みずむし・たむし等又は化膿している患部。

#### 3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください。

#### 4. 連続して2週間以上使用しないでください。(本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診療を受けてください)

#### ☒ 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (4) 高齢者。
- (5) 過去の診断を受けた人。 気管支ぜんそく

#### 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮ふ	発疹、発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、青あざができる、色素沈着
消化器	胃部不快感、みぞおちの痛み
その他	むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

#### 3. 使用後、次の症状があらわれることがありますので、この様な症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

#### ☒ 症状 下痢・軟便

#### 4. 5~6日間使用しても症状が良くならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(他の疾患の可能性があります)

#### その他の注意

入浴する場合は、貼った場所がヒリヒリすることがありますので、必ず30分以上前にはがしてください。また、入浴後は30分以上経過してから使用してください。

## 効能・効果

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、挫挫

## 用法・用量

表面のセパレーター(フィルム)をはがし、1日1回患部に貼付してください。

#### ■用法・用量に関する注意

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3)1日あたり4枚を超えて使用しないでください。
- (4)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (5)皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発赤、発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (6)発熱するもの(コタツ、ホットカーペット、カイロ、電気毛布等)と併用しますと、刺激が強くなることがありますので注意してください。

## 成分・分量(膏体100g中)

ロキソプロフェンナトリウム水和物	8.1g
(無水物として7.14g)	

添加物として、流動パラフィン、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、水素添加ロジングリセリンエステル、ポリイソブレン、ジブチルヒドロキシトルエニン、香料(ノニル酸フニルアミド)、その他2成分を含有します。

## 保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かないところに保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(4)誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

#### 副作用被害救済制度

(独)医薬品医療機器総合機構  
TEL 0120-149-931

ニチバン株式会社

〒112-8663  
東京都文京区関口2-3-3

お問い合わせ先:お客様相談室  
TEL 0120-377218

受付時間: 9:00~12:00, 13:00~17:00(土日、祝日を除く)



TMは商標です。 日本製 MADE IN JAPAN NB20C01