

スピール膏®M 使用説明書


本品の使用方法について医師等から特別な指示がない場合は、下記の使用方法によりご使用ください。

【本品の説明】

本品はうおの目、たこ、いぼの厚く硬くなった皮ふ（角質）を軟化して取り除くお薬です。布に塗布した類白色の膏体が皮ふにはり付ける薬剤部分で、黄色の紙は、はく離紙です。

【使用方法】

- ①薬剤部分をはく離紙からはがし、患部大（患部と同じ大きさ）に切りとります。
- ②切り取った薬剤部分を患部の中央にはり、ズレないように絆創膏や粘着包帯などでしっかり固定し、2~5日毎に新しい薬剤と交換してください。
- ③患部をお湯に浸して軟らかくしたり、入浴後にご使用になると一層効果があがります。この場合は患部をよく拭いて乾燥させてからはってください。
- ④交換の際には、白くなったり角質部を消毒したピンセットなどで痛みを感じない程度に取り除きます。
- ⑤患部が完全にとりきれない場合は新たに本品を貼り、繰り返し①~④を続けます。
- ⑥うおの目、たこを取った後、患部が陥没したり角質が白くなりますが、新しい皮ふが再生されますので、清潔を保ってください。



【注意】

- もし本品の使用中に発疹・発赤等の過敏症状、皮ふの化膿等があらわれた場合は使用を中止し、医師に相談してください。
- 本品は作用の強い薬ですから、医師から指示された部位以外には絶対に使用しないでください。
- 患部より大きくはらないでください。薬剤部分が健康な皮ふに付着するとその部分が痛んだり白く軟化しますので、患部の周りの皮ふにつかないよう注意してください。
- 本品を使用したまま入浴してもさしつかえありませんが、患部を密封するなど、ぬれてはがれないように注意してください。ぬれてしまった場合でも水分をよく吸い取ってそのままご使用できますが、はがれてしまった場合は交換してください。
- 本品は直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しい所に保存してください。

ニチバン株式会社

〒102-8811 東京都千代田区麹町5-1

2025年11月改訂